Escola Básica 2º e 3º ciclos de santo António

Disciplina: Ciências Físico-Químicas

Ano Lectivo: 2010/2011

Como preparar uma solução de sulfato do cobre e a sua diluição

- * Docente: Eugenia Temtem
- * Disciplina: Ciências Física - Química
- * 7ºE

Trabalho elaborado por:

Jessica Caires nº7

Funchal, 26 de Março de 2011

Índice

Conteúdo

Objectivos	4
Fundamento Teórico	4
Parte experimental	5
Material:.....	5
Procedimento	5
Parte A:.....	5
Parte B:.....	6
Resultados obtidos	7
↳ Observações	7
↳ Tratamento de resultados	7
Determinar a concentração máxima da 1 ^o solução:.....	7
Determinar a massa presente nos 25 ml.pipetados da 1 ^a solução:.....	8
Determinar a concentração da 3 ^o solução:.....	8
Conclusão	9
Bibliografia/Webgrafia	10

Introdução

Este trabalho foi-me proposto no âmbito da disciplina de físico - química cujo tema é fazer um relatório da experiência realizada no laboratório de química da escola: "como preparar uma solução de sulfato de cobre e a sua diluição".

Ao longo do trabalho irei descrever o procedimento da experiência que foi realizado, bem como os materiais de laboratório utilizados e que são indispensáveis à preparação de uma solução e, ainda, apresentar todos os cálculos necessários relativos à determinação do valor de concentração das soluções de sulfato de cobre preparadas.

Objectivos

- ↪ Identificar e manusear correctamente algum material de laboratório.
- ↪ Utilizar o material necessário à realização da actividade experimental de forma correcta e cuidadosa.
- ↪ Preparar uma solução aquosa e respectiva diluição.
- ↪ Determinar a concentração (composição quantitativa) da solução.

Fundamento Teórico

Os materiais que nos rodeiam podem ser classificados como substâncias, se forem formados apenas por uma única componente, por exemplo o oxigénio, ou mistura de substâncias, caso sejam constituídos por mais do que uma substância, por exemplo a água da torneira.

As misturas de substâncias, por sua vez, classificam-se em três tipos de misturas: homogéneas, heterogéneas e coloidais. Esta classificação é feita de acordo com o aspecto visível ou não da mistura em estudo.

As misturas homogéneas líquidas podem também ser designadas por soluções. Cada solução é composta por dois tipos de componentes: um solvente e um ou mais solutos. O solvente é o componente que está presente em maior quantidade e o que dissolve um ou mais componentes que lhe são adicionados, sendo estes identificados pelo seu termo geral "*soluto*".

A água é, na maior parte das soluções, o solvente sendo por isso designadas por solução aquosas. Também existem soluções cujo solvente é o álcool e por isso são designadas por soluções alcoólicas.

Cada solução pode ser descrita qualitativamente e quantitativamente, de acordo com as quantidades e tipos de soluto e solvente presentes. A composição quantitativa de uma solução ou concentração de uma solução define-se pela seguinte expressão:

$$C(\text{solução}) = \frac{m(\text{soluto})}{V(\text{solução})}$$

onde, C - concentração da solução; m - massa do soluto; V - volume da solução, sendo C expresso em g/mL (g/cm^3), m - expresso em g e V expresso em mL ou cm^3 .

De acordo com a quantidade relativa de soluto e de solvente que as soluções contêm, estas podem ser mais diluídas ou mais concentradas.

Parte experimental

Material:

- * Sulfato de cobre;
- * Água;
- * Gobelé de 150 ml;
- * Dois balões volumétricos de 100 ml e de 250 ml;
- * Pipeta volumétrica de 25 ml;
- * Pompete;
- * Conta - gotas;
- * Vareta;
- * Balança.

Procedimento

Parte A:

1. Num gobelé limpo e seco, pesou-se 4 g de sulfato de cobre penta - hidratado.
2. Juntou-se a água e agitou-se para dissolver todo o sólido.
3. Transferiu-se a solução obtida para o balão volumétrico de 100 ml.
4. Lavou-se o gobelé com água e transferiu-se de novo para o balão.
5. Juntou-se água até à marca do balão, agitando para homogeneizar a solução (*solução A*).

Parte B:

1. Com a pipeta volumétrica equipada com pêra de borracha, transferiu-se 25 ml da solução preparada para o balão volumétrico de 250 ml (*não fazer sucção com boca para enchimento da pipeta*).
2. Juntou-se água até à marca, agitando para homogeneizar a solução (*solução B*).

Resultados obtidos

↳ Observações

	1ª Solução	2ª Solução
Observação	<ul style="list-style-type: none">-> 100 ml-> Azul + escura-> + Concentração	<ul style="list-style-type: none">-> 250 ml-> Azul + clara-> + Diluição

↳ Tratamento de resultados

DADOS GERAIS:

Para a 1ª solução

massa (de soluto pesada) = 3,9 g

V (1ª solução) = 100 mL

Para a 2ª solução

V (pipetado da 1ª solução) = 25 mL

V (2ª solução) = 250 mL

1º Passo:

Determinar a concentração máxima da 1ª solução:

Dados:

massa (de soluto pesada) = 3,9 g

V (1ª solução) = 100 mL

$$C(\text{solução}) = \frac{m(\text{soluto})}{V(\text{solução})} = \frac{3,9}{100} = 0,039 \text{ g/mL}$$

2º Passo:

Determinar a massa presente nos 25 ml.pipetados da 1ª solução:

Dados:

$m(\text{solute}) = ?$

$V(\text{solução}) = 25 \text{ ml}$

$C(\text{solução}) = 0,039 \text{ g/ml}$

$$m(\text{solute}) = C(\text{solução}) \times V(\text{solução}) = 0,039 \times 25 = 0,975 \text{ g}$$

3º Passo:

Determinar a concentração da 3ª solução:

Dados:

$m(\text{solute}) = 0,975 \text{ g}$

$V(\text{solução}) = 250 \text{ mL}$

$$C(\text{solução}) = \frac{m(\text{solute})}{V(\text{solução})} = \frac{0,975}{250} = 0,0039 \text{ g/mL}$$

Conclusão

É possível preparar uma solução num laboratório e efectuar a respectiva diluição recorrendo aos materiais adequados a estes procedimentos, os quais exigem algum cuidado e rigor no seu manuseamento.

Nesta actividade preparei uma solução de sulfato de cobre de concentração 0,039 g/mL. Posteriormente dilui 25mL desta solução, transferindo este volume para um balão de 250 mL e perfazendo a sua capacidade com a adição cuidadosa de mais solvente (água). Esta segunda solução apresentava uma coloração menos intensa do que a primeira pois encontrava-se menos concentrada o que foi confirmado pela determinação da sua composição quantitativa da, cujo valor obtido foi de 0,0039 g/mL, o qual é inferior ao valor determinado para a 1ª solução.

As soluções preparadas podem ser designadas por solução aquosa de sulfato de cobre, uma vez que o solvente é água.

Bibliografia/Webgrafia

Fiolhais C.; Gil, V.; e outros; "7 CFQ - Terra no Espaço / Terra em Transformação" Textos Editores, 2006.

www.amigos-do-planetazul.webnode.pt